



Bruksanvisning BINAB TF WP

Användningsområde

BINAB TF WP används förebyggande vid bekämpning av svampsjukdomar i så väl växthus som på friland för potatis, snittblommor, krukväxter, gräsytor, grönsaker, blomsterlökar, bär och frukt, samt för prydnadsträd.

BINAB TF WP bekämpar svamppatogener som *Botrytis*, *Verticillium*, *Pythium*, *Fusarium*, *Rhizoctonia*, häxringar och andra jordburna svamppatogener, samt *Didymella*, Silverglanssjuka och Rotröta.

Produkten är baserad på sporer av de naturligt förekommande svamparna *Trichoderma polysporum*, och *Trichoderma harzianum*.

Hur fungerar det?

När BINAB TF WP appliceras, blir produkten aktiv inom 48 timmar. Den växer på plantan eller i plantans rotzon där den finner näring, i huvudsak sjukdomsalstrande svampar.

Tillväxtstärkande

Trichoderma spp. producerar ämnen som hjälper sticklingen/plantan att rota sig och dessutom att bygga upp ett försvar mot svampgrepp. Internationella försök visar att försvaret, så kallad "inducerad resistens" är aktiv i ungefär 14 dagar efter tillsättning.

Utrustning

Applicering sker lättast genom utvattning eller besputning. Det är mycket viktigt att appliceringsutrustningen är väl rengjord från bekämpningsmedel innan den används. Kontinuerlig omrörning vid tillsättning erfordras för jämn fördelning.

Säkerhet och krav

Det aktiva organismerna i BINAB TF WP är placerade i samma säkerhetsklass som brödjäst av ECMM,



European Confederation for Medical Mycology. BINAB TF WP är aktiv från 2°C-32°C.

Lagring och återvinning

Produkten är en färskvara med ett bäst före datum beroende på förvaring: 2 år vid -18°C, 5 månader vid +8°C och 2 veckor vid 20°C. Ej använd produkt kan komposteras eller deponeras för anläggning för hushållssopor. Rengjord förpackning lämnas till återvinning.

Användning

Jordbehandling: Skydda trädgårdsväxter mot jordbundna skadesvampar genom att behandla jorden med BINAB TF WP före plantering och sådd eller vid behov under säsongen. Blanda 2 teskedar med 10 liter vatten under omrörning. Det räcker upp till 10 m² vid spridning med vattenkanna med fin stril eller spridarramp. Kontinuerlig tillsättning varannan till var fjärde vecka rekommenderas.

Gråmögel på jordgubbar: Reducera angrepp av gråmögel på jordgubbar genom att behandla med BINAB TF WP från blomningen. Blanda 2 teskedar med 10 liter vatten under omrörning. Det räcker till 10 m² vid spridning med vattenkanna med fin stril eller spridarramp. Vid sprutning räcker det till 30 m². Behandla direkt på plantan en gång i veckan, vid kall och fuktig väderlek, som gynnar gråmögelsvampen, behandla 2ggr/vecka. Behandla vid uppehållsväder.

Svartfläcksjuka på rosor: Skydda rosorna genom att förebyggande spruta på senhösten och tidig vår med 2-4 kryddmått BINAB TF WP med 10 liter vatten och ett par droppar såpa för bättre vidhäftning.

Färdig blandning måste användas inom ett dygn.



www.wexthuset.com