

# Biologiskt Växtskydd

## ÖRONVIVEL

Öronvivel eller växthusvivel (*Otiornhyncus* sp.) angriper plantor som rhododendron, azalea och häckar m.fl. De vuxna vivlarna är ca. 12 mm långa och gråbruna med ljusa fläckar på bakkroppen. De är mest aktiva på natten och gömmer sig på dagen.

Det är därför lättast att upptäcka ett angrepp genom att hålla ögonen på skadesymptomen, som är ett karakteristiskt halvmåneformat gnag i bladkanten ("billjettklipp"). Öronvivelns larver gör emellertid ännu större skada med sitt gnag på rötterna och rothalsen. Det kan vara så ödeläggande, att stora plantor välter.



Gnag på blad




Gnag på rothals



## NYTTODJUR

Nematoder mot öronvivel vattnas ut på jorden ovanför rötterna. Nematoder är mikroskopiska ringmaskar, som tränger in i öronvivelns larver och dödar dem inifrån. Vid behandling i trädgården följ behandlingstidspunkterna i schemat. Temperaturen i jorden bör vara min. 12 °C.



### Användning

Växthus	april	oktober
Fönsterkarm	hela året	
Uterummet	hela året	
Trädgården	maj	juni augusti september



### Nyttodjursbeställning:

Nematoder mot öronvivel kan beställas här i butiken. Fråga personalen vid kassan angående beställningskupong och betalning. Nyttodjuren mottager ni med posten.



Wexthuset - återförsäljare  
av Biobasiq produkter

